

Έγκυρες χρήσεις

Στόχος	Πεδίο εφαρμογής	Δόση εφαρμογής	Μέθοδος Εφαρμογής
Οικιακοί ποντικοί (<i>Mus musculus</i>) - Όλα τα στάδια	Εσωτερικοί χώροι και εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων	Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δολώματος. Υψηλή προσβολή - 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα. Χαμηλή προσβολή - 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δολώματος. Υψηλή προσβολή - 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Χαμηλή προσβολή - 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα. Στις στοές: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά στοά.	Δολωματική εφαρμογή. Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία δολώσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant) ή απευθείας εφαρμογή των ετοιμόχρηστων δολωμάτων μέσα στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.
Καφέ αρουραίοι (<i>Rattus norvegicus</i>) - Όλα τα στάδια	Υπόνομοι	Σε υπανόμους, τοποθετήστε 200 γρ. έως 300 γρ. δολώματος κάθε 30-50 μέτρα (όχι περισσότερο από 300 γρ. σε κάθε φρεάτιο).	Δολωματική εφαρμογή. Ετοιμόχρηστο δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται εντός δολωματικών σταθμών έτσι ώστε το δόλωμα να μην έρθει σε επαφή με τα πόδια.

Οδηγίες χρήσης

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επίπονο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε το είδος των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριοποίησής τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χαμηνί σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίζετε το ρυθιζόμενο από τρωκτικά χώρο κερκίδας πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς καιά τέτοια διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοτικότητα του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών (και όχι περιλαμβανόμενα, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης).
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία καταστροφής φρούτων, σημεία τροφής, τρύπες, λαγυμίδια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στα έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να αναλύονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες είναι εφαρμογή με τρωκτοκτόνα θα πρέπει να επισήμανονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να ενημεώνει τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπικτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθετώντας δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, από και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά αεκία ή επιφανείες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας νεφίλλου ή βινυλλίου κατά το οποίο σχεδιασμού του προϊόντος.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του.
- Η συνιστώμενη επίκληση στις περιοχές εφαρμογής δολωμάτων, εξαρτάται από το κείριστό, υπό το πρίσμα της έρευνας που έγινε κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η

- αυστικότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η καταπόληση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στην δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπικτικού τρωκτοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ταχύτερου αντιπικτικού τρωκτοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης πηκτικού, ως ένα επιπλέον μέτρο ελέγχου.
- Στους εξωτερικούς χώρους τα καλυμμένα και προφυλισμένα σημεία δολώσης θα πρέπει να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να ελπιωθεί η έκθεση ζώων μη στόχους.
- Πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του πληθυσμού-στόχου, όταν επιλέγεται το τρωκτοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί. Στις περιοχές εκείνες που υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αποφεύγετε τη χρήση τους. Για τον έλεγχο εξήλιξης της ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπικτικές δραστικές ουσίες.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επανερωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 ή 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) και κάθε 5-7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελεγχεται αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν ορθοί, καθώς και για να απομακρυνθούν τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώστε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Απομακρύνετε υπολπόνο προϊόντος όταν λήξει η περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισήμανονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "να μην μετακινείται και να μην αναλύεται", "περιέχει τρωκτοκτόνο", "τοxicότητα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική(-ές) ουσία(-ές)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηρίασεων [Πηλέφανο κέντρο δηλητηρίασεων: 210 77 93 777]".

Οδηγίες χρήσης που είναι "ειδικές για δολώματα":

- **Δόλωμα σε φακελάκια:** Για φακελάκια που δεν οδεύονται - Μην ανοίγετε τα φακελάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- **Δόλωμα ανά τακτά διαστήματα (Pulsed baiting):** Αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και κατόπιν το ποσό κάθε 7 ημέρες. Συμπληρώστε τα δολώματα που έχουν χυθεί και τα νεκρά τρωκτικά.
- **Δόλωμα σε στοές τρωκτικών:** Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελπιωνοποιείται η έκθεση σε είδη μη στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και έκλυσης των δολωμάτων.

RATCUM PASTA

Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας 10gr (RB)

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας ΥΠΑΑΤ: ΤΠ14-0053 / 03-01-2014

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
Brodifacoum 0,005% β/β
Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β
Περιέχει πικραντικό - αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate
Χρώμα κόκκινο

Αντιπικτικό τρωκτοκτόνο για καταπολέμηση οικιακών ποντικών (*Mus musculus*) και καφέ αρουραίων (*Rattus norvegicus*)



“ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ”

Κάτοχος της έγκρισης:
Pelgar International Limited,
18 rue des Remparts d'Ainay 69002, Lyon, Γαλλία

Διανομέας: **ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε.**
Αγ. Παύλου 39, 121 32 Περιστέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 8542220, 210 8542270, Fax. 210 8542253
www.protecta-health.gr • e-mail: info@protecta-health.gr



ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ

2,5kg	5kg	10kg
--------------	------------	-------------



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Να φοράτε προστατευτικά γάντια.
- ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό.
- Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
- Φυλάσσετε κλειδωμένο.
- Διαβάστε τον περιεχόμενο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μη ξηλώνονται.
- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, ναντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.
- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [Σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
- Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στα δραστικά ουσία.
- Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Για λόγους αξιοπιστίας της ανθεκτικότητας, μην αναμιγνύετε τα αντιπικτικά οκευαστικά με άλλα αντιπικτικά παράσιμα ή χαμηλότερης ισχύος. Για αναλήψη χρήσης με άλλα τρωκτοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπικτικό τρωκτοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα ταχύτερο αντιπικτικό τρωκτοκτόνο.
- Μετά από την εφαρμογή, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύγερνα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Δόλωμα σε στοές - Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
- Εξετάστε το ενδεχόμενο πηλψης προληπτικών μέτρων (π.χ. καλύψτε τις στοές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιώσετε τη πήψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της καταπολέμησης, σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
- Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφυλάξης.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ

Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπικτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.
Αντιδοτό: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτινιατρικό προσωπικό.
Σε περίπτωση:
- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
- Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατώντας τα βλεφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε ουδόποτε από το στόμα σε αναισθητό άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.
Τηλέφωνο κέντρου δηλητηρίασεων: 210 77 93 777
Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτινιατρό.
- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος/αυσεκασίας

Κατά το τέλος της περιόδου καταπολέμησης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες
- Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο.
- Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το πηλκό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.
- Διατηρήστε το στην αρχική συσκευασία.

Άλλες πληροφορίες

Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπικτικών τρωκτοκτόνων, μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες από την κατάληψη του δολωμάτων για να υπάρξει αποτελεσματικότητα. Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες. Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μη χρωστική ουσία.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

Καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Επιτρέπεται η πώληση του μόνο σε αυθεντικά μωκτοκίνα που έχουν άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: (PROD. DATE): ΑΡ. ΠΑΡΤΙΔΑΣ: (LOT No): **ΒΛΕΠΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ**